

牙槽外科

oral surgery

一、修复前外科

基本器械



1

牙槽突修整术

适应证

上、下颌牙槽骨骨尖或骨嵴

上颌牙槽骨前突

拔牙术后的牙槽骨修整，宜在拔牙术后2~3月进行

1





牙槽骨修整术方法步骤

切开

翻瓣

去骨

缝合





牙槽突修整术

操作技巧及注意事项

保护重要的解剖结构（神经、血管）

翻瓣时骨膜剥离器伸入骨膜下（全层黏骨膜）

外形检查时要先将软组织瓣复位

冲洗要彻底

2

腭隆突修整术

适应证

腭部经常磨破，溃烂

当后堤区封闭不好或者有影响取模的很大的倒凹存在

语音障碍

2


腭隆突修整术方法步骤

切开

翻瓣

去骨

缝合





腭隆突修整术

操作技巧及注意事项

麻醉时要在隆突周围的局部做浸润麻醉，有利于黏骨膜瓣的翻起

因为腭隆突处粘骨膜很薄，翻瓣时注意不要撕裂黏膜

硬腭骨板薄弱，操作要逐层进行，防止与鼻腔相通

3

下颌隆突修整术

适应证

下颌骨隆突妨碍义齿的安装

骨隆突过高，导致患者自觉不适

3


下颌隆突修整术方法步骤

切开

翻瓣

去骨

缝合





下颌隆突修整术

操作技巧及注意事项

切口范围应超过隆突两侧各约两个牙位的长度，避免粘膜被牵拉撕裂

由于粘膜较薄，整个过程要注意保护翻开的黏骨膜瓣

术后嘱患者用湿纱布轻压住翻开的瓣半小时，有助于纤维粘合，并且防止血肿形成

4

上颌结节肥大修整术

适应证

颌间距离减小

倒凹影响义齿制作以及就位

影响义齿稳定的可移动软组织

4



腭隆突修整术方法步骤


切开

翻瓣

去骨

缝合





上颌结节肥大修整术